

<i>Original</i>	<i>Translation</i>
<p><b>Antabuse</b>  Generic name: disulfiram  Brand name: antabuse</p> <p><u>What is disulfiram (Antabuse)?</u></p> <p>Disulfiram interferes with the metabolism of alcohol resulting in unpleasant effects when alcohol is consumed.</p> <p>Disulfiram is used to treat chronic alcoholism.</p> <p>Disulfiram may also be used for purposes other than those listed in this medication guide.</p> <p><u>What are the possible side effects of disulfiram (Antabuse)?</u></p> <p>Severe and sometimes fatal liver problems have occurred in patients taking disulfiram even without a prior history of liver problems.</p> <p>If you experience any of the following serious side effects, stop taking disulfiram and seek emergency medical attention:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• an allergic reaction (swelling of your lips, tongue, or face; shortness of breath; closing of your throat; or hives);</li> <li>• seizures;</li> <li>• extreme tiredness;</li> <li>• dark urine;</li> <li>• yellowing of the skin or eyes (jaundice);</li> <li>• large appetite changes;</li> <li>• weakness, dizziness or loss of coordination; or</li> <li>• severe diarrhea or vomiting.</li> </ul> <p>Other, less serious side effects may be more likely to occur. Continue to take disulfiram and talk to your doctor if you experience</p>	<p><b>Антабус</b>  Международное непатентованное наименование: дисульфирам  Торговое название: Антабус (Antabuse)</p> <p><u>Что представляет собой дисульфирам (Антабус)?</u></p> <p>Дисульфирам препятствует метаболизму алкоголя, приводящему к неприятным последствиям при употреблении спиртного. Дисульфирам используется для лечения хронического алкоголизма. Дисульфирам можно также использовать для целей, отличных от тех, которые перечислены в данном руководстве по медикаментам.</p> <p><u>Каковы возможные побочные эффекты дисульфирама (Антабус)?</u></p> <p>У пациентов, принимающих дисульфирам, могут возникнуть серьезные проблемы с печенью, иногда приводящие к фатальным последствиям, даже если до этого у них не было проблем с печенью. Если у вас возникли какие-либо из следующих серьезных побочных эффектов, прекратите принимать дисульфирам и обратитесь за неотложной медицинской помощью:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• аллергическая реакция (отек губ, языка или лица, одышка, отек горла (закрытие входа в гортань) или крапивница);</li> <li>• судороги;</li> <li>• сильная усталость;</li> <li>• темный цвет мочи;</li> <li>• пожелтение кожи или глаз (желтуха);</li> <li>• значительные изменения аппетита;</li> <li>• слабость, головокружение или потеря координации; или</li> <li>• тяжелая диарея или рвота.</li> </ul> <p>Более вероятны другие, менее серьезные побочные эффекты. Продолжайте принимать дисульфирам и поговорите со своим врачом, если у вас</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• кожная сыпь или прыщи;</li> <li>• легкие головные боли;</li> <li>• умеренная сонливость или усталость;</li> <li>• импотенция;</li> <li>• металлический вкус во рту; или</li> <li>• отек или боль в области языка.</li> </ul>

- skin rash or acne;
- mild headaches;
- mild drowsiness or tiredness;
- impotence;
- metallic taste in the mouth; or
- swollen or sore tongue.

Side effects other than those listed here may also occur. Talk to your doctor about any side effect that seems unusual or that is especially bothersome.

What is the most important information I should know about disulfiram (Antabuse)?

Do not drink alcohol while taking disulfiram. Flushing, fast heartbeats, nausea, thirst, chest pain, vertigo, and low blood pressure may occur when alcohol is ingested during disulfiram therapy.

Do not take disulfiram for at least 12 hours after drinking alcohol.

Reactions may occur from drinking alcohol for several weeks after you have stopped taking disulfiram.

Be aware of the alcohol content of other common products such as cough and cold medicines, mouth washes, tonics, sauces, vinegars, and other food products. Alcohol in these products can also cause a reaction.

Возможны также другие, не перечисленные здесь побочные эффекты. Поговорите со своим врачом о любом побочном эффекте, который кажется необычным или особенно беспокоящим.